

Vacinas para o adulto e idoso

| Vacina | Proteção Contra | Composição | Número de Doses | | Idade Recomendada | Intervalo entre as Doses | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|
| | | | Esquema Básico | Reforço | | Recomendado | Mínimo |
| Hepatite B recombinante | Hepatite B | Antígeno recombinante de superfície do vírus purificado | 3 doses (iniciar ou completar o esquema, de acordo com situação vacinal) | - | - | 2ª dose: 1 mês após 1ª dose 3ª dose: 6 meses após 1ª dose | 2ª dose: 1 mês após 1ª dose 3ª dose: 4 meses após 1ª dose |
| Difteria e Tétano (dT) | Difteria e Tétano | Toxoides diftérico e tetânico purificados, inativada | 3 doses (iniciar ou completar o esquema, de acordo com situação vacinal) | A cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves a cada 5 anos | - | 60 dias | 30 dias |
| Febre Amarela (Atenuada) | Febre Amarela | Vírus vivo atenuado | Dose única, para pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação | Reforço, caso a pessoa tenha recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade até 59 anos de idade. | Dose única para pessoas até 59 anos de idade, não vacinada. | - | - |
| Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR) (1) (2) | Sarampo, Caxumba e Rubéola | Vírus vivo atenuado | 2 doses (20 a 29 anos) 1 dose (30 a 59 anos) (verificar situação vacinal anterior) | - | - | - | 30 dias |
| Pneumocócica 23-valente (PPV 23) (3) | Meningite, Sepses, Pneumonias, Sinusite, Otite e Bronquite | Polissacarídeo capsular de 23 sorotipos pneumococos | 1 dose | 1 dose deve ser feita 5 anos após a primeira dose | 60 anos (acamados ou institucionalizados) | - | - |

Notas:

- (1) As pessoas que tiverem esquema vacinal completo, independentemente da idade em que foram vacinadas, não precisam receber doses adicionais.
- (2) A vacinação em bloqueios está indicada em contatos de casos suspeitos de sarampo e rubéola, a partir dos 6 meses. Para os adultos com até 29 anos e profissionais de saúde de qualquer idade, recomenda-se duas doses da vacina SCR, com intervalo de 30 dias. Recomenda-se não engravidar por um período de 30 dias, após a aplicação da vacina.
- (3) Esta vacina está indicada para pessoas a partir dos 60 anos de idade em condições clínicas especiais (acamados, hospitalizados ou institucionalizados) e povos indígenas a partir dos 5 (cinco) anos de idade.